



## 請加入我們！

膽管癌基金會是一個501 (c) (3) 非盈利組織。其宗旨是透過

合作(Collaboration)、了解(Understanding)、研究(Research)、教育(Education)的四個層面治癒(CURE)膽管癌：

**合作。**膽管癌基金會致力於促進研究人員、醫療人員、公共事業機構和非營利組織之間的合作。

**了解。**膽管癌基金會為膽管癌病患、照顧者，以及家族成員提供支援。

**研究。**膽管癌基金會向膽管癌的研究人員提供贈款，促進膽管癌的研究。

**教育。**膽管癌基金會透過網站、一年兩次的通訊、醫療會議、接觸社區，提供膽管癌的最新資訊。

[www.cholangiocarcinoma.org](http://www.cholangiocarcinoma.org)



欲知詳情或以捐款資助本基金會，  
請訪問我們的網站或  
通過電子郵件聯絡我們。

[www.cholangiocarcinoma.org](http://www.cholangiocarcinoma.org)


[info@cholangiocarcinoma.org](mailto:info@cholangiocarcinoma.org)

獲扣稅的捐款，可寄往：

*The Cholangiocarcinoma Foundation  
5526 West 13400 South, #510  
Salt Lake City, Utah 84096  
U.S.A.*

*(801) 999-0455*

病人、照顧者、研究人員、醫療人員、私人及公共事業機構  
同心協力尋求治癒膽管癌。



## 什麼是膽管癌？

膽管癌或膽道癌是出現在膽管組織及其支管內的惡性腫瘤。腫瘤可能會出現在沿著膽管的任何位置。膽管癌經常是指是膽管系統的任何原發癌。然而，從醫學歷史上看，膽管癌是限指位於肝臟內的膽管所形成的惡性腫瘤。

## 什麼是膽道系統？

膽道系統是包括肝臟、膽囊和小腸之間，運送膽汁的網絡或樹形結構的管狀通道。肝臟分泌膽汁，膽汁存於膽囊內。膽汁的功用是幫助食物中的脂肪乳化，及消除肝臟從血液中過慮到的有毒廢物。位於肝內的左、右肝膽管收集膽汁，左、右肝膽管在肝外匯合成肝總管，然後再匯合膽囊管形成總膽管(肝外膽管)，將膽汁排入小腸內。

## 膽管癌的症狀是什麼？


患上膽管癌的病人，其症狀可能有不同，要根據腫瘤的範圍和位置才能作準。此外，膽管癌的症狀也可能由其他狀況導致。因此，如有下列情況時，請諮詢醫生：

- 黃疸 - 皮膚或眼 發黃
- 腹痛
- 皮膚瘙癢
- 體重降低
- 食慾不振
- 肝功能異常
- 糞便或尿液的顏色有變化
- 發燒

## 哪些是導致膽管癌的危險要素？

根據研究顯示，某些病變可能增加導致膽管癌的機會。導致增加危險要素的病變如下：

- 原發性硬化性膽管炎：慢性膽管炎症
- 慢性潰瘍性結腸炎：慢性腸道炎症
- 膽總管囊腫：膽管生出囊樣的結構



## 什麼是肝內膽管癌？

是指肝臟內的膽管有惡性腫瘤的形式。肝內膽管癌目前歸類為原發性肝癌。在美國被診斷患有肝癌的新病患裡，估計百分之十是肝內膽管癌。

## 什麼是Klatskin氏腫瘤？

Klatskin氏腫瘤又稱肝門部膽管癌，是肝外惡性腫瘤，出現於左、右肝膽管在肝外的接合點。在美國，此癌症佔膽管癌新例總數約三分之二。

## 什麼是肝外膽管癌？

是指肝臟外的膽管有惡性腫瘤的形式。肝外膽管與來自膽囊的一條管道連接，形成總膽管。肝外膽管癌最常見的類型是腺癌。

## 什麼是遠端膽管癌？

遠端膽管癌是肝外膽管底部的惡性腫瘤，它位於膽管的底部，靠近總膽管、小腸和胰臟的交匯處。由於位置的緣故，治療遠端膽管癌的方法往往與胰臟癌類似。

## 治療膽管癌有哪些方法？

膽管癌的治療過程，將取決於腫瘤的位置、大小和癌症的分期，以及患者的一般健康狀況、年齡和治療偏好。治療的方式仍在逐步發展中，它包括手術、肝臟移植手術、化療、放射治療、光動力療法、膽管引流術。

